



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables



Elaborado por: Belisa Menéndez Flores

Resumen Ejecutivo

Impacto y consecuencias de la violencia contra las mujeres

PNCVFS – MIMP

Noviembre 2017

Antecedentes

- En los últimos años, la violencia contra la mujer ha disminuido de manera constante pero a la vez a un ritmo lento. En relación a esto, son muchos los estudios que se han abocado en estudiar sus causas, pocas han evaluado sus consecuencias.
- Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia infligida por la pareja afecta a la salud física y mental de la mujer en formas directas, por ejemplo lesiones, y formas indirectas, como problemas crónicos de salud por estrés prolongado.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Antecedentes

- Asimismo, refiere que investigaciones actuales indican que la influencia del maltrato puede persistir mucho tiempo después de que haya cesado la violencia. Cuanto más grave sea el maltrato, mayores serán sus repercusiones sobre la salud física y mental de la mujer, y las consecuencias de los diferentes tipos y múltiples episodios de maltrato parecen ser acumulativas con el transcurso del tiempo. 1/
- El estudio Impacto y consecuencias de la violencia contra las mujeres se realizó a fines del año 2015, a través de una consultoría, utilizó la base de datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2014.

1/ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98816/1/WHO_RHR_12.36_spa.pdf



Objetivo

- Evaluar el impacto de las mujeres víctimas de violencia ejercida por el esposo o compañero sobre diversas variables de interés, como la salud mental, salud física, sobre la justificación de la violencia, interrupción de embarazos, alimentación saludable, entre otras variables de interés.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Aspectos metodológicos

- La metodología que se empleó fue el emparejamiento estadístico (Propensity score matching), el cual permite medir cuál es el efecto de la violencia a partir de preguntarse: ¿Qué hubiera pasado si la mujer no hubiese sido víctima de violencia?, su aplicación requirió la construcción de grupos de tratamiento (con violencia) y control (sin violencia).



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Aspectos metodológicos

- En la tabla siguiente se presentan las variables de resultado empleadas en el estudio:

Tabla 3:

Variables de resultado de impacto de la violencia contra la mujer

GRUPO AFECTADO	TEMA	VARIABLES DE RESULTADO
MUJER	Salud mental	Índice de depresión Índice de deseabilidad social
	Salud	Hipertensión Diabetes Consumo de alcohol Consumo de tabaco
	Justificación de violencia	Razones por las que se justifica la violencia
	Interrupción de embarazos	Embarazos interrumpidos por pérdida, aborto o nacimiento del niño o niña sin vida
	Alimentación saludable	Frutas consumidas (en últimos siete días) Verduras consumidas (en últimos siete días)
	Castigo a hijas e hijos	Castigo físico a hijas e hijos en último mes (castigo de corto plazo) Uso de castigo físico como necesidad para educación de hijas a hijos (castigo estructural)



Aspectos metodológicos

...Continúa

GRUPO AFECTADO	TEMA	VARIABLES DE RESULTADO
HIJAS E HIJOS	Lactancia	Lactancia diurna Lactancia nocturna Lactancia diaria (diurna más nocturna)
	Dolencias menores	Fiebre en últimos quince días Diarrea en últimos quince días Tos en últimos quince días
	Desarrollo	Talla y peso Vacunas recibidas Uso de vitamina A

Fuente: ENDES 2008 al 2014
Elaboración de la consultoría



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Resultados

- Salud mental de las mujeres:

Considerando que la deseabilidad social recoge aspectos psicológicos que miden si la mujer busca presentarse de forma más valorada socialmente, la ENDES identificó la variable mediante el estado de ánimo de la mujer.

- El estudio reveló que el impacto de la violencia contra la mujer aumenta en 13% su falta de deseabilidad social frente al grupo de mujeres que no sufrieron violencia.
- Se encontró efectos en la depresión reciente (últimos 14 días) de las mujeres con violencia frente a las mujeres sin violencia. De un aumento del 31%.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Resultados

- La violencia aumenta en 35% la proporción de mujeres que justifica la violencia contra su propio género (por las siguientes razones: salir de casa sin decirle nada a la pareja, descuidar a los niños, discutir con la pareja, negarse a tener relaciones sexuales y quemar la comida).
- Disminuye en 8% y 4% el impacto de la violencia sobre el consumo de verduras y frutas (en los últimos 7 días) en las mujeres con hábitos alimenticios saludables; el grupo de mujeres con violencia tiene un menor consumo de verduras y frutas frente al grupo de mujeres sin violencia.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Resultados

- La violencia genera un aumento del 26% en embarazos que no llegan a su fin.
- La violencia impacta en un aumento de 18% en el uso del castigo físico sobre los hijos e hijas; similar resultado se da en el impacto de la violencia en la percepción de las mujeres sobre el castigo físico como necesidad para educar a los hijos e hijas (el aumento es de 19%).



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Resultados

No se presentó resultados significativos del impacto de la violencia contra la mujer:

- En general, sobre la hipertensión, diabetes, consumo de alcohol (en los últimos 30 días, ni en los últimos 12 meses), ni en el consumo diario de tabaco.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Resultados

De los resultados del impacto de la violencia sobre los hijos e hijas:

Sobre los indicadores de lactancia materna se evaluaron tres aspectos de la lactancia: primera sesión de la lactancia, lactancia diurna y lactancia nocturna.

- No se encontró impacto en la primera sesión de lactancia ni el número de sesiones diurnas.
- La violencia sobre la madre reduce en 14% el número de veces que alimenta a su hijo/a durante la noche, pasando de 5.42 tomas en el grupo de mujeres sin violencia, a 4.68 en el grupo de mujeres con violencia.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Resultados

- La violencia impacta en forma negativa sobre el consumo de vitamina A, hay una menor ingesta en los hijos e hijas del grupo de mujeres con violencia frente a las mujeres sin violencia.
- Finalmente, no se encontró impacto sobre la anemia de los hijos e hijas, ni sobre el nivel de hemoglobina.
- Tampoco se encontró impacto sobre la aplicación de vacunas como la DPT (1ra, 2da y 3ra aplicación), contra la tuberculosis, ni el sarampión.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Conclusiones y recomendaciones

- Fortalecer los programas de salud mental y dotarlos de mejores herramientas para identificar y tratar a las mujeres víctimas de violencia.
- Desarrollar campañas de comunicación eficaces para informar a las madres gestantes sobre los riesgos que la violencia tienen sobre sus hijos e hijas; y
- En razón que los programas solo atienden las consecuencias de la violencia, mas no sus causas, seria importante fortalecer las acciones de prevención y dirigir los programas hacia las mujeres en mayor situación de riesgo.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables